

# Inventaire des espèces d'oiseaux

Par Andréas GUYOT, naturaliste

Ne sont pris en compte que les oiseaux posés dans les arbres, au sol ou sur le plan d'eau lors des migrations ou pendant la nidification, avec une interaction directe dans la zone d'étude du plan d'eau. (à l'intérieur de la zone rouge et verte).

Aucun oiseau n'a été comptabilisé lorsqu'il était en vol.

## La méthodologie :

- Le recensement est fait par l'observation d'une vacation de 2h minimum et de 3h maximum, avec une longue-vue et une paire de jumelles.
- L'écoute au lever du jour et pendant 1h pour les chants des passereaux.



Oiseaux nicheurs : Dans la zone de nidification en vert.

Canard colvert : *Anas platyrhynchos*

Foulque macroule : *Fulica atra*

Grèbe huppé : *Podiceps cristatus*

Poule d'eau : *Gallinula chloropus*

Petit gravelot : *Charadrius dubius*

Oiseaux visiteurs : Dans la zone de pose en rouge et en vert.

Grèbe castagneux : *Tachybaptus ruficollis*

Grand cormoran : *Phalacrocorax carbo*

Héron cendré : *Ardea cinerea*

Héron pourpré : *Ardea purpurea*

Bihoreau gris : *Nycticorax nycticorax*

Héron gardeboeuf : *Bubulcus ibis*

Aigrette garzette : *Egretta garzetta*

Grande aigrette : *Ardea alba*

Cigogne blanche : *Ciconia ciconia*

Cygne tuberculé : *Cygnus olor*

Oie cendrée : *Anser anser*

Fuligule milouin : *Aythya ferina*

Fuligule Morillon : *Aythya fuligula*

Canard souchet : *Anas clypeata*

Canard chipeau : *Anas strepera*

Canard siffleur : *Anas penelope*

Sarcelle d'hiver : *Anas crecca*

Sarcelle d'été : *Anas querquedula*

Seuls ses deux rapaces ont été observés posés.

Milan noir : *Milvus migrans*

Elanion blanc : *Elanus caeruleus*

Goéland leucophée : *Larus michahellis*

Mouette rieuse : *Chroicocephalus ridibundus*

Guifette noire : *Chlidonias niger*

Vanneau huppé : *Vanellus vanellus*

Chevalier gambette : *Tringa totanus*

Chevalier guignette : *Actitis hypoleucos*

Chevalier culblanc : *Tringa ochropus*

Chevalier sylvain : *Tringa glareola*

Chevalier Aboyeur : *Tringa nebularia*

Combattant varié : *Philomachus pugnax*

Barge à queue noire : *Limosa limosa*

Bécasseau variable : *Calidris alpina*

Bécasseau minute : *Calidris minuta*

Bécasseau de Bonaparte : *Calidris fuscicollis*

Grand gravelot : *Charadrius hiaticula*

Echasse blanche : *Himantopus himantopus*

Bécassine des marais : *Gallinago gallinago*

Oiseaux passereaux : Leur dépendance au milieu dans la zone rouge et verte et très aléatoire. L'interaction n'y est pas vitale.

Hirondelle de cheminée : *Hirundo rustica*

Hirondelle de fenêtre : *Delichon urbicum*

Hirondelle de rivage : *Riparia riparia*

Pipit farlouse : *Anthus pratensis*

Pipit spioncelle : *Anthus spinoletta*

Bergeronnette grise : *Motacilla alba*

Bergeronnette des ruisseaux : *Motacilla cinerea*

Bergeronnette printanière : *Motacilla flava*

Traquet motteux : *Oenanthe oenanthe*

Traquet pâtre : *Saxicola rubicola*

Traquet tarier : *Saxicola rubetra*

Chardonneret : *Carduelis carduelis*

Fauvette à tête noire : *Sylvia atricapilla*

Fauvette grisette : *Sylvia communis*

Hypolaïs polyglotte : *Hippolais polyglotta*

Rossignol philomèle : *Luscinia megarhynchos*

Leiothrix jaune : *Leiothrix lutea*

Tourterelle turque : *Streptopelia decaocto*

Tourterelle des bois : *Streptopelia turtur*

Pigeon ramier : *Columba palumbus*

Rougegorge : *Erithacus rubecula*

Mésange charbonnière : *Parus major*

Mésange bleue : *Cyanistes caeruleus*

Mésange à longue queue : *Aegithalos caudatus*

Grive musicienne : *Turdus philomelos*

Pinson des arbres : *Fringilla coelebs*

Pinson du nord : *Fringilla montifringilla*

Linotte mélodieuse : *Linaria cannabina*

Verdier d'Europe : *Chloris chloris*

Merle noir : *Turdus merula*

Corneille noire : *Corvus corone*

Etourneau sansonnet : *Sturnus vulgaris*