



Légende


- Observations du Milan noir au cours des inventaires
- Habitats ouverts favorables à l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats potentiels de nidification (41)
- Habitats avérés de nidification (41)
- Nouveau périmètre proposé
- Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ★ Lieu-dit






Légende


- Observations du Milan noir au cours des inventaires
- Habitats ouverts favorables à l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats potentiels de nidification (41)
- Habitats avérés de nidification (41)
- Nouveau périmètre proposé
- Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ★ Lieu-dit






Légende


- Observations du Milan noir au cours des inventaires
- Habitats ouverts favorables à l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats potentiels de nidification (41)
- Habitats avérés de nidification (41)
- Nouveau périmètre proposé
- Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ★ Lieu-dit






Légende


- Observations du Milan noir au cours des inventaires
- Habitats ouverts favorables à l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats potentiels de nidification (41)
- Habitats avérés de nidification (41)
- Nouveau périmètre proposé
- Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ★ Lieu-dit







Légende


- Observations du Milan noir au cours des inventaires
- Habitats ouverts favorables à l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats potentiels de nidification (41)
- Habitats avérés de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ★ Lieu-dit






Légende


- Observations du Milan noir au cours des inventaires
- Habitats ouverts favorables à l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats potentiels de nidification (41)
- Habitats avérés de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ★ Lieu-dit






Légende


- Observation de la Bondrée apivore au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ★ Lieu-dit






Légende


- Observation de la Bondrée apivore au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation de la Bondrée apivore au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation de la Bondrée apivore au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation de la Bondrée apivore au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation de la Bondrée apivore au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation de la Bondrée apivore au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation de la Bondrée apivore au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- Nouveau périmètre proposé
- Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation de la Bondrée apivore au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation de la Bondrée apivore au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation de la Bondrée apivore au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit







Légende


- Observation de la Bondrée apivore au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ★ Lieu-dit






Légende


- Observation de la Bondrée apivore au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation de l'Aigle botté au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ★ Lieu-dit






Légende


- Observation de l'Aigle botté au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation de l'Aigle botté au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation de l'Aigle botté au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation de l'Aigle botté au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation de l'Aigle botté au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- Nouveau périmètre proposé
- Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ★ Lieu-dit






Légende

- Observation de l'Aigle botté au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation de l'Aigle botté au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- Nouveau périmètre proposé
- Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation de l'Aigle botté au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation de l'Aigle botté au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation de l'Aigle botté au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation de l'Aigle botté au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ★ Lieu-dit






Légende


- Observation de l'Aigle botté au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers potentiels de nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation du Circaète Jean-le-Blanc au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers favorables à la nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ★ Lieu-dit






Légende


- Observation du Circaète Jean-le-Blanc au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers favorables à la nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation du Circaète Jean-le-Blanc au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers favorables à la nidification (41)
- Nouveau périmètre proposé
- Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation du Circaète Jean-le-Blanc au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers favorables à la nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation du Circaète Jean-le-Blanc au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers favorables à la nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation du Circaète Jean-le-Blanc au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers favorables à la nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ★ Lieu-dit






Légende


- Observation du Circaète Jean-le-Blanc au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers favorables à la nidification (41)
- Nouveau périmètre proposé
- Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation du Circaète Jean-le-Blanc au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers favorables à la nidification (41)
- Nouveau périmètre proposé
- Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ★ Lieu-dit






Légende


- Observation du Circaète Jean-le-Blanc au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers favorables à la nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation du Circaète Jean-le-Blanc au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers favorables à la nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit






Légende


- Observation du Circaète Jean-le-Blanc au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers favorables à la nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit







Légende


- Observation du Circaète Jean-le-Blanc au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers favorables à la nidification (41)
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ★ Lieu-dit






Légende


- Observation du Circaète Jean-le-Blanc au cours des inventaires
- Habitats ouverts avérés pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats forestiers favorables à la nidification (41)
- Nouveau périmètre proposé
- Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ★ Lieu-dit






Légende


- Observation du Busard Saint-Martin au cours des inventaires
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ★ Lieu-dit
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts avérés d'alimentation (31)
- Habitats ouverts potentiels de nidification (31.23)






Légende


- Observation du Busard Saint-Martin au cours des inventaires
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts avérés d'alimentation (31)
- Habitats ouverts potentiels de nidification (31,23)






Légende


- Observation du Busard Saint-Martin au cours des inventaires
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts avérés d'alimentation (31)
- Habitats ouverts potentiels de nidification (31.23)






Légende

- Observation du Busard Saint-Martin au cours des inventaires
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts avérés d'alimentation (31)
- Habitats ouverts potentiels de nidification (31,23)





Légende

- Observation du Busard Saint-Martin au cours des inventaires
- ▭ Nouveau périmètre proposé
- ▭ Périmètre initial ZPS
- ◆ Col
- Village
- ▲ Sommet
- ✱ Lieu-dit
- Habitats ouverts potentiels pour l'alimentation (31, 35, 38)
- Habitats ouverts avérés d'alimentation (31)
- Habitats ouverts potentiels de nidification (31.23)

